

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

※最大4コースまで行い、NIVO  
単剤に切り替える

治療(GEM+CBDCA+NIVO 肺)

( ) クール目 )

※EGFR-、ALK-、PD-L1<1%の扁平上皮・前治療歴なし(術後補助は除く)

( 身長 ( ) cm 体重 ( ) kg 体表面積 ( ) m<sup>2</sup> )

体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者

( ) の理由にて、( ) %量で投与します。


( ) 年

Day1、8

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					Day1	Day8
	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)		
②	オプジーボ 360mg/body ( 360 )mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は 60分	点滴 (メイン)		
③	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)		
④	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A		10分	点滴 (側管)		
④'	グラニセトロン3mg/100mL デカドロン4mg 1A		30分	点滴 (側管)		
⑤	ゲムシタビン(ジェムザール) 1000mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (メイン)		
⑥	カルボプラチン AUC : 5 ( )mg/body	生食 500mL	2時間	点滴 (メイン)		
デカドロン錠 ( 8 ) mg (day2~ 3 日間) 内服					<input checked="" type="checkbox"/>	

投与方法

①フィルター付きケモセーフロック輸液セ: ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ



①ケモセーフロック輸液セット ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ

