

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

化療(GEM+CDDP 胆)

(  クール目 )

( 身長  cm 体重  kg 体表面積  m<sup>2</sup> )  
 体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000


指示者
<input type="text"/>

(  ) の理由にて、(  ) %量で投与します。


	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					day1	day8
					/	/
①	生食500mL ※⑥⑦投与時はクランプ			ルートキープ(メインルート)		
②	ポタコールR500mL		2時間	点滴(側管)		
③	○ プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴(側管)		
	● プロイメンドなし					
④	アロキシ 0.75mg /50mL		10分	点滴(側管)		
	デカドロン4mg 2A					
⑤	ゲムシタビン(ジェムザール)	生食	30分	点滴(メイン)		
	1000mg/m <sup>2</sup> ( <input type="text"/> )mg/body	100mL				
⑥	マンニトール300mL		45分	点滴(側管)		
⑦	シスプラチン(プリプラチン)	生食	2時間	点滴(メイン)		
	25mg/m <sup>2</sup> ( <input type="text"/> )mg/body	500mL				
⑧	ポタコールR500mL		2時間	点滴(側管)		

尿量測定指示  有り Day(  )まで施行  
 無し:体重測定で代用 Day(  )まで施行  
 無し

投与方法



投与スケジュール



～減量基準～

CCr	CDDP 投与量
>60	100%
60 ≧ >45	75%
45 ≧	中止が望ましい

※ABC-02試験ではCCr ≦ 45は除外基準となっていた