

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※最大4コースまで行い、NIVO
単剤に切り替える

化療(GEM+CDDP+NIVO 肺)

() クール目)

※EGFR-、ALK-、PD-L1<1%の扁平上皮・前治療歴なし(術後補助は除く)

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)
体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

() 年

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	day1	day2	day3	day8
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/	/	/
②	生食500mL		ルートキープ	点滴 (側管1)	/	/	/	/
③	オプジーボ 360mg/body () mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は 60分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
④	硫酸マグネシウム 20mEq 1V アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑤	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑤'	グラニセトロン3mg/100mL デカドロン 1A		30分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑥	ゲムシタピン(ジェムザール) 1250mg/m ² () mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
⑦	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑧	マンニトール300mL		40分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑨	シスプラチン(プリプラチン) 35mg/m ² () mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
⑩	シスプラチン(プリプラチン) 40mg/m ² () mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
⑪	アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑫	生食500mL×2V (経口補水液摂取可能時には省略可)		4時間	点滴	/	☑	☑	/
デカドロン錠 (8) mg (day2~_3_日間) 内服					☑			

CDDP投与量目安

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≥CCr>45	75%
45≥CCr	投与中止が望ましい。

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し:体重測定で代用 Day()まで施行
 無し

