

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※最大1コース行い、NIVO+IPI維持療法に切り替える

治療(PEM+CBDCA+NIVO+IPI 肺) () クール目 ()

※EGFR-、ALK-の非扁平上皮・前治療歴なし(術後補助は除く)

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

※前投薬<<day-6~最終投与から22日後>> バンピタン末1g 1×朝食後 (/) ~ (/)


※筋注薬

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day-6	day57	day120	day183
a	メコバラミン注500 μg 2A		ワンショット 9週間隔	筋注	/	/ ㊟	/ ㊟	/ ㊟


() の理由にて、() %量で投与します。() 年

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日					
					day0	day1	day2	day21	day22	day23
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/	/	/	/	/
②	オプジーボ 360mg/body (360)mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は 60分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
	ルートキープを流しながら経過観察		30分	経過観察	/	/	/	/	/	/
③	ヤーボイ 1mg/kg ()mg/body ※1~4mg/mLになるようにNS量適宜調整	生食 20mL	30分以上 ※初回は 60分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
④	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑤	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A		10分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑥	アリムタ 500mg/m ² ()mg/body	生食 100mL	10分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
	ルートキープを流しながら経過観察		30分	経過観察	/	/	/	/	/	/
⑦	カルボプラチン AUC=5~6 ()mg/body	ポタコールR 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑧	デカドロン錠 (4) mg			内服	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	デカドロン錠 (8) mg (化学療法翌日:day2・23~_3_日間)			内服			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

※インラインフィルター(0.2~5 μm)を用いて投与する。



投与スケジュール () 年



※メコバラミン注はPEM投与1週間以上前に投与し、9週ごとに投与