

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※最大4コースまで行い、PEM+NIVO
維持療法に切り替える

化療(PEM+CBDCA+NIVO 肺)

(/ /) クール目

※EGFR-, ALK-, PD-L1<1%の非扁平上皮・前治療歴なし(術後補助は除く)

(身長 / cm 体重 / kg 体表面積 / m²)
体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

※前投薬(day-6~最終投与から22日後)

・パンピタン末1g 1×朝食後 (/) ~ (/)

※※筋注薬


	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day-6	day57	day120	day183
a	メコバラミン注500μg 2A		ワンショット 9週間隔	筋注	/	/ 回	/ 回	/ 回

(/ /) の理由にて、(/) %量で投与します。 (/ /) 年


	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日		
					day0	day1	day2
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/	/
②	オブジーボ 360mg/body (/)mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は 60分	点滴 (メイン)	/	/	/
③	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	/	/	/
④	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A		10分	点滴 (側管)	/	/	/
⑤	アリムタ 500mg/m ² (/)mg/body	生食 100mL	10分	点滴 (メイン)	/	/	/
	ルートキープを流しながら経過観察		30分	経過観察	/	/	/
⑥	カルボプラチン AUC=5~6 (/)mg/body	ポタコールR 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/
⑦	デカドロン錠 (/) mg			内服	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	デカドロン錠 (/) mg (day2~ / 日間) 内服				/	/	<input checked="" type="checkbox"/>

←投与時にはこのDay2はなし

※インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与する。



投与スケジュール (/ /) 年



※メコバラミン注はPEM投与1週間以上前に投与し、9週ごとに投与