

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

※最大1コース行い、NIVO+IPI維持療法に切り替える

化療(PEM+CDDP+NIVO+IPI 肺) ( ) クール目 ( )

※EGFR-, ALK-の非扁平上皮・前治療歴なし(術後補助は除く)

(身長 ( ) cm 体重 ( ) kg 体表面積 ( ) m<sup>2</sup>)  
 体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者 ( )

※前投薬(day-6~最終投与から22日後)

バンピタン末1g 1×朝食後 ( / ) ~ ( / )

※※筋注薬

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day-6	day57	day120	day183
a	メコバラミン注500 μg 2A		リンシヨット 9週間隔	筋注	/	/	/	/

( ) の理由にて、( ) %量で投与します。( ) ( ) 年

※オプジーボはフィルターを通す


	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日								
					day0	day1	day2	day3	day21	day22	day23	day24	
①	生食100mL			ルートキーブ (メインルート)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
②	生食500mL		5時間	点滴 (側管1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
③	オプジーボ 360mg/body ( ( ) mg/body )	生食 100mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン) ※フィルター 通す	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30分経過観察					/	/	/	/	/	/	/	/	/
④	ヤーボイ 1mg/kg ( ( ) mg/body )	生食 20mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン) ※フィルター 通す	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑤	硫酸マグネシウム 20mEq 1V アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑥	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑦	アリムタ 500mg/m <sup>2</sup> ( ( ) mg/body )	生食 100mL	10分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑧	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑨	マンニトール300mL		40分	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑩	シスプラチン(プリプラチン) 35mg/m <sup>2</sup> ( ( ) mg/body )	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑪	シスプラチン(プリプラチン) 40mg/m <sup>2</sup> ( ( ) mg/body )	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑫	アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/
⑬	生食500mL	※Day2・3/23・24の補液は経 口補液(OS1を1L)での対応で 可。	2時間	点滴	/	/	☑	☑	/	/	☑	☑	/
⑭	生食500mL		2時間	点滴	/	/	☑	☑	/	/	☑	☑	/
PEM投与前日 デカドロン錠(4) mg 内服					☑	/	/	/	☑	/	/	/	/
デカドロン錠(8) mg (化学療法翌日:day2・23~_3_日間) 内服					/	/	☑	/	/	/	☑	/	/

尿量測定指示  有り Day( )まで施行  
 無し:体重測定で代用 Day( )まで施行  
 無し


CDDP投与量目安

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≧CCr>45	75%
45≧CCr	投与中止が望ましい。

投与方法



投与スケジュール ( ) 年



※メコバラミン注はPEM投与1週間以上前に投与し、9週ごとに投与