

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4コースまで行い、PEM+NIVOに切り替える

化療(PEM+CDDP+NIVO 肺)

() クール目

※EGFR-, ALK-, PD-L1<1%の非扁平上皮・前治療歴なし(術後補助は除く)
(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

※前投薬(day-6~最終投与から22日後)

・パンピタン末1g 1×朝食後 (/) ~ (/)

※※筋注薬

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day-6	day57	day120	day183
a	メコバラミン注500μg 2A		ワンショット 9週間隔	筋注	/	/	/	/

() の理由にて、() %量で投与します。

() 年

※オプジーボはフィルターを通す


	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day0	day1	day2	day3
①	生食100mL			ルートキープ (メイン)	/	/	/	/
②	生食500mL		5時間	点滴 (側管1)	/	/	/	/
③	オプジーボ 360mg/body (360) mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン) ※フィルター 通す	/	/	/	/
④	硫酸マグネシウム 20mEq 1V アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑤	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑥	アリムタ 500mg/m ² () mg/body	生食 100mL	10分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
⑦	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑧	マンニトール300mL		40分	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑨	シスプラチン(プリプラチン) 35mg/m ² () mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
⑩	シスプラチン(プリプラチン) 40mg/m ² () mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/
⑪	アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/
⑫	生食500mL		2時間	点滴	/	/	☑	☑
⑬	生食500mL		2時間	点滴	/	/	☑	☑
Day0 デカドロン錠 (4) mg 内服					☑	/	/	/
デカドロン錠 (8) mg (day2~_3日間) 内服					/	☑	/	/

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≥CCr>45	75%
45≥CCr	投与中止が望ましい。

※Day2,3の補液は経口補液(OS1を1L)での対応可。

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し:体重測定で代用 Day()まで施行
 無し

投与方法



投与スケジュール()年

