

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療(PEM+NIVO 維持療法 肺) (クール目)

※PEM+CDDP/CBDCA+NIVO施行後の維持療法

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

※前投薬<<day-6~最終投与から22日後>>

・パンピタン末1g 1×朝食後 (/) ~ (/)


※※筋注薬

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day-7	4クール目	7クール目	10クール目
a	メコバラミン注500μg 2A		ワンショット 9週間隔	筋注	/	/	/	/


() の理由にて、() %量で投与します。 () 年

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日		
					day0 (投与前日)	day1	day2
①	生食 100mL		ルート キープ	点滴 (メインルート)	/	/	/
②	オプジーボ 360mg/body (360) mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/
③	グラニセロン3mg/100mL +デカドロン注4mg 2A		30分	点滴 (側管)	/	/	/
④	アリムタ 500mg/m ² () mg/body	生食 100mL	10分	点滴 (メイン)	/	/	/
⑤	デカドロン錠 (4) mg			内服	<input checked="" type="checkbox"/>	/	<input checked="" type="checkbox"/>

※インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与する。



投与スケジュール (年)



※メコバラミン注はPEM投与1週間以上前に投与し、9週ごとに投与