

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4～6コースまで行
い、BV+Atezo維持療
法に切り替える

化療(PTX+CBDCA+BV+Atezo 肺)

() クール目)

※非扁平上皮、術後補助・EGFR/ALK-TKI 以外の前治療なし

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

() 年


Day1

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					/
①	生食 100mL		ルートキープ ^o	点滴 (メインルート)	
②	テセントリク 1200mg/body (1200)mg/body	生食 250mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン)	
初回のみ30分ルートキープにて経過観察					
③	ポララミン注5mg 1A	生食20mL	5分	静注 (側管)	
	デカドロン4mg 3A				
	ファモチジン注20mg 1A				
④	アバステン 15mg/kg () mg/body	生食 100mL	1回目:90分 2回目:60分 3回目以降: 30分	点滴 (メイン)	1回目(/) 2回目(/) 3回目(/)
⑤	プロイメント 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
⑥	アロキン 0.75mg /50mL		10分	点滴 (側管)	
⑦	パクリタキセルNK 200mg/m ² ()mg/body	5%ブドウ糖 500mL	3時間	点滴 (メイン)	
⑧	カルボプラチン AUC:6 ()mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	
デカドロン錠0.5mg 朝 8 昼 8 夕 0 (day2～3日間)					<input checked="" type="checkbox"/>

※インラインフィルター(0.2～5μm)を用いて投与する。

投与方法

①フィルター付きケモセーフロック輸液セット ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ



※初回のみ②投与後30分経過観察 2回目以降30分 3回目以降30分

投与スケジュール () 年

