

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

※最大1コース行い、NIVO+IPI  
維持療法に切り替える

治療(PTX+CBDCA+NIVO+IPI 肺)

( ) クール目 )

※EGFR-、ALK-の扁平上皮、術後補助以外の前治療なし

( 身長 ( ) cm 体重 ( ) kg 体表面積 ( ) m<sup>2</sup> )

体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者


( ) の理由にて、( ) %量で投与します。

( ) 年

Day1

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					Day1	Day22
	生食 100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/
①	生食 100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)		
②	オプジーボ 360mg/body ( 360 )mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン)		
30分以上経過観察						
③	ヤーボイ 1mg/kg ( )mg/body ※1~4mg/mLになるようにNS量適宜調整	生食 20mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン)		
④	ボラミン注5mg 1A デカドロン4mg 3A ファモチジン注20mg 1A	生食20mL	3分かけて	静注 (側管)		
⑤	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)		
⑥	アロキシ 0.75mg /50mL		10分	点滴 (側管)		
⑦	パクリタキセルNK 200mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body	5%ブドウ糖 500mL	3時間	点滴 (メイン)		
⑧	カルボプラチン AUC:6 ( )mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)		
デカドロン錠 (8) mg (化学療法翌日: day2・23 ~ 3 日間) 内服					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

※インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与する。



投与スケジュール ( ) 年

