

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療(S1+GEM 胆)

(クール目)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

Day8,15 体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000


| |
|-----|
| 指示者 |
| |

() の理由にて、() %量で投与します。

| | 薬物 | 溶解液 | 投与時間 | 投与経路 | 投与日 | |
|---|--|-------------|--------------|----------------|--------------------|------|
| | | | | | Day1 | Day8 |
| | | | | | / | / |
| ① | 生食 100mL | | ルートキープ | 点滴 (メインルート) | | |
| ② | グラニセトン3mg/100mL | | 30分 | 点滴 (側管) | | |
| | デカドロン4mg 1A | | | | | |
| ③ | ゲムシタビン(ジェムザール) 1000mg/m ² (<input type="text"/>)mg/body | 生食 100mL | 30分 | 点滴 (メイン) | | |
| ④ | TS-1 (投与量:下記参照) (<input type="text"/>)mg/body | | 1日2回 朝夕食後 | 内服 | day1夕~day15朝 内服 | |

投与方法

- ①ルートキープ:ケモセーフロック輸液セット
- ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ



S1投与量

| 体表面積 | 1日投与量 |
|---|-------|
| 1.25m ² 未満 | 80mg |
| 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 | 100mg |
| 1.5m ² 以上 | 120mg |

※S1は腎機能に応じて減量する

| CCr | 投与量 |
|-----------|-------------|
| CCr>80 | 基準量 |
| 80≥CCr>60 | 必要に応じて1段階減量 |
| 60≥CCr>40 | 1段階以上の減量 |
| 40≥CCr>30 | 2段階減量が望ましい。 |
| 30≥CCr | 投与不可。 |

投与スケジュール

