

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4コースまで行い、アリムタ+キイトルーダに切り替える

化療(アリムタ+カルボプラチン+キイトルーダ 肺)

(クール目)

※非扁平上皮、術後補助以外の前治療なし

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)
 体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

| |
|-----|
| 指示者 |
| |

※前投薬(day-6~最終投与から22日後)

・パンピタン末1g 1×朝食後 (/) ~ (/)

※※筋注薬


| | 薬物 | 溶解液 | 投与時間 | 投与経路 | 投与日 | | | |
|---|-----------------|-----|----------------|------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | | day-6 | day57 | day120 | day183 |
| a | メコバラミン注500μg 2A | | ワンショット 9週間隔 | 筋注 | / | / 回 | / 回 | / 回 |

() の理由にて、() %量で投与します。 () 年


| | 薬物 | 溶解液 | 投与時間 | 投与経路 | 投与日 | | |
|---|---|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | day0 | day1 | day2 |
| ① | 生食100mL | | ルートキープ | 点滴 (メインルート) | / | / | / |
| ② | キイトルーダ 200mg/body (200)mg/body | 生食 100mL | 30分 ※初回は 60分 | 点滴 (メイン) | / | / | / |
| ③ | プロイメンド 150mg | 生食100mL | 30分 | 点滴 (側管) | / | / | / |
| ④ | アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A | | 10分 | 点滴 (側管) | / | / | / |
| ⑤ | アリムタ 500mg/m ² ()mg/body | 生食 100mL | 10分 | 点滴 (メイン) | / | / | / |
| | ルートキープを流しながら経過観察 | | 30分 | 経過観察 | / | / | / |
| ⑥ | カルボプラチン AUC5 ()mg/body | ポタコールR 250mL | 1時間 | 点滴 (メイン) | / | / | / |
| ⑦ | デカドロン錠0.5mg 8T2× | | | 内服 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | デカドロン錠0.5mg 朝_8_昼_8_夕_0_ (day2~_3_日間) | | | | / | / | <input checked="" type="checkbox"/> |

←投与時にはこのDay2はなし

※インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与する。



投与スケジュール()年



※メコバラミン注はPEM投与1週間以上前に投与し、9週ごとに投与