

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4コースまで行い、キイトルーダ単剤に切り替える

治療(パクリタキセル+カルボプラチン+キイトルーダ 肺) (クール目)

※扁平上皮、術後補助以外の前治療なし

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

() 年


Day1

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					/
①	生食 100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	
②	キイトルーダ 200mg/body (200)mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン)	
③	ボララミン注5mg 1A デカドロン4mg 3A ファモチジン注20mg 1A	生食20mL	3分かけて	静注 (側管)	
④	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
⑤	アロキシ 0.75mg /50mL		10分	点滴 (側管)	
⑥	パクリタキセルNK 200mg/m ² ()mg/body	5%ブドウ糖 500mL	3時間	点滴 (メイン)	
⑦	カルボプラチン AUC:6 ()mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	
デカドロン錠0.5mg 朝_8_昼_8_夕_0_ (day2~_3_日間)					<input checked="" type="checkbox"/>

※インラインフィルター(0.2~5μm)を用いて投与する。

投与方法

①フィルター付きケモセーフロック輸液セット ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ



投与スケジュール () 年

