

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※基本的には4コースまで

化療(CPT-11+CDDP(ショート) 肺・NEC)

(クール目)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

Day1:7時間セット

Day8/15:3時間セット


() の理由にて、() %量で投与します。

※UGT1A1遺伝子多型: なし あり()

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日				
					Day1	Day2	Day3	Day8	Day15
①	生食100mL		ルートキープ (メインルート)		/	/	/	/	/
②	生食500mL		7時間	点滴 (側管1)	/	/	/	/	/
③	ホスアプレピタント 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管2)				○ あり ● なし	
④	デカドロン4mg 3A パロノセトロン 0.75mg /50mL		10分	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/
⑤	イリノテカン 60mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 250mL	90分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/
⑥	KCL(カウム) 10mEq 1V	生食500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/
⑦	硫酸マグネシウム 20mEq 1V	生食500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/
⑧	マンニトール 300mL		40分	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/
⑨	シスプラチン 30mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/
⑩	シスプラチン 30mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/
⑪	KCL(カウム) 10mEq 1V	生食500mL	1時間	点滴 (側管2)	/	/	/	/	/
⑫	生食 500mL×2V		4時間	点滴	/	☑	☑	/	/
⑬	デカドロン錠 (8) mg (day2~_3_日間)			内服	☑				

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≥CCr>45	75%
45≥CCr	投与中止が望ましい。

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し:体重測定で代用 Day()まで施行
 無し



投与スケジュール

