

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

1クール目:3時間セット
2クール目~:2時間セット

化療(NIVO+IPI:MSI-High結腸・直腸)

() クール目)
※最大4クール施行し、
NIVO単剤へ切替える

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。


() 年)

Day1

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					/
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	
②	オプジーボ 240mg/body (240)mg/body	生食 100mL	30分 以上 ※1クール目は60分	点滴 (メイン)	
30分以上経過観察					
③	ヤーボイ 1mg/kg 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body ※1~4mg/mLになるようにNS量適宜調整	生食 20mL	30分 以上 ※1クール目は60分	点滴 (メイン)	
血糖or血糖 自己測定指示 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし					

投与方法 ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ

①フィルター付きケモセーフロック輸液セット



投与スケジュール

