

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

初回：7時間セット
2クール目～Day1：6時間セット
Day8：3時間セット
(クール目)

化療(mFOLFOX6+Weekly C-mab 末梢用 大腸)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)
体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					day1 /	day8 /
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)		
②	ボラミン注5mg 1A デカドロン3.3mg (3)A ※症状に応じて変更可	生食100mL	30分	点滴 (側管)		
初回のみ ③	アービタックス 400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食500mL	2時間	点滴 (メイン)	初回のみ	
2回目以後 ③	アービタックス 250mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食250mL	1時間まで短縮可	点滴 (メイン)		
経過観察(ルートキープをフラッシュ)			30分or1時間		30分	1時間
④	<input type="radio"/> ホスアプレピタント 150mg <input checked="" type="radio"/> ホスアプレピタントなし	生食100mL	30分	経過観察を 行いつつ 点滴 (側管)		
⑤	パロノセトロン 0.75mg/50mL		10分			
⑥	エルプラット* 85mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 500mL	2時間	点滴 (メイン)		
	デカドロン3.3mg1A					
⑦	レボホリナート 200mg/m ² 100%Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (側管)		
⑧	5-FU 400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 100mL	全開で 投与	点滴 (メイン)		
⑨	5-FU 2400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食 1L	46時間	持続注 (メイン)		

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(制吐剤前)にボラミン注投与
+デカドロン5Aへ変更+エルプラット開始90分程度は減速投与で対応も可



