

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

1クール目:4時間セット
2クール目:3時間セット

化療(ビラフトビ+メクトビ+Weekly Cmad 大腸)

※前治療歴があるBRAF変異陽性患者に使用

(      ) クール目 )


( 身長      cm 体重      kg 体表面積      m<sup>2</sup> )  
 体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者

(      ) の理由にて、(      ) %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg・CPK測定を行う、12週毎に心機能評価を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日 day1
①	生食 100mL		ルートキープ(メインルート)		/
②	ポラミン注5mg 1A デカドロン4mg ( 3 )A ※症状に応じて変更可	生食 100mL	30分	点滴 (側管)	
初回のみ ③	アービタックス 400mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      )mg/body	生食 500mL	2時間	点滴 (メイン)	
2回目以後 ③'	アービタックス 250mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      )mg/body	生食 250mL	1時間まで 短縮可	点滴 (メイン)	
④	ビラフトビカプセル 通常300mg/body(規格:75mg) (      300      )mg/body		1日1回 夕食後	内服	
⑤	メクトビ錠 通常90mg/body(規格:15mg) (      90      )mg/body		1日2回 朝夕食後 (1クール目 Day1夕~開始)	内服	



投与スケジュール

