

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※最大6コース施行後、5FU+KEYに切り替える

化療(FP+KEY 食道)

() クール目 ①~⑤⑩⑪は病棟で投与可

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

Day1:4-7時間セット
↑①~⑤病棟施行の場合は4時間セット
Day2~5:2時間セット

() の理由にて、() %量で投与します。

					投与日					
	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	day0	day1	day2	day3	day4	day5
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)	/	/	/	/	/	/
②	硫酸マグネシウム 20mEq 1V KCL(カウム) 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
③	ホスアプレピタント 150mg	生食250mL	30分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④'	デカドロン 2A	生食500mL	1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑤	マンニトール300mL		1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑥	シスプラチン 40mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑦	シスプラチン 40mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑧	キイトルーダ 200mg/body (200) mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は 1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑨	5FU 800mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食 500mL	24時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑩	EL-3号 500mL		2時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑪	EL-3号 500mL		2時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/


CDDP投与量目安

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≥CCr>45	75%
45≥CCr	投与中止が望ましい。

血糖or血糖 自己測定指示 あり なし

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し;体重測定で代用 Day()まで施行
 無し

投与方法



投与スケジュール

