

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4～6コース行い、PEM+ゲフィチニブ維持療法に切り替える

化療(PEM+CBDCA+ゲフィチニブ 肺)

(クール目)

3時間セット

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)
体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^0.725*体重^0.425/10000

指示者

※前投薬<<day-6～最終投与から22日後>>

・パンピタン末1g 1×朝食後 (/) ~ (/)

※※筋注薬

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日			
					day-6	day57	day120	day183
a	メコバラミン注500μg 2A		ワンショット 9週間隔	筋注	/	/ 頃	/ 頃	/ 頃


() の理由にて、() %量で投与します。

(年)


	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日		
					day0	day1	day2
					/	/	/
①	生食100mL		ルートキープ°	点滴 (メインルート)			
②	ホスアプレピタント 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)			
③	パロノセトロン 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A		10分	点滴 (側管)			
④	ペメトレキセド 500mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 100mL	10分	点滴 (メイン)			
	ルートキープを流しながら経過観察		30分	経過観察			
⑤	カルボプラチン AUC=5 ()mg/body	ポタコールR 250mL	1時間	点滴 (メイン)			
⑥	ゲフィチニブ(イレッサ)錠250mg		連日内服		<input checked="" type="checkbox"/>		
⑦	デカドロン錠(4)mg		内服		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	デカドロン錠(8)mg (day2～3日間) 内服						<input checked="" type="checkbox"/>

←投与時には⑦のDay2はなし

投与方法



投与スケジュール (年)



※メコバラミン注はPEM投与1週間以上前に投与し、9週ごとに投与