

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

初回:7時間セット
2クール目~Day1:6時間セット
Day8:3時間セット

化療(mFOLFOX6+Weekly C-mab CVホート用 大腸)

() クール目

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)
 体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					day1 /	day8 /
①	生食100mL		ルートキープ (メインルート)			
②	ボラリン注5mg 1A デカドロン3.3mg (3)A ※症状に応じて変更可	生食100mL	30分	点滴 (側管)		
初回のみ ③	アービタックス 400mg/m ² 100%Dose : () mg %Dose : () mg () mg/body	生食500mL	2時間	点滴 (メイン)	初回のみ	
2回目以後 ③	アービタックス 250mg/m ² 100%Dose : () mg %Dose : () mg () mg/body	生食250mL	1時間まで短縮可	点滴 (メイン)		
	経過観察(ルートキープをフラッシュ)		30分or1時間		30分	1時間
④	○ ホスアプレピタント 150mg ● ホスアプレピタントなし	生食100mL	30分	経過観察を 行いつつ 点滴 (側管)		
⑤	パロノセトロン 0.75mg/50mL		10分			
⑥	エルブラット* 85mg/m ² 100%Dose : () mg %Dose : () mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (メイン)		
⑦	レボホリナート 200mg/m ² 100%Dose : () mg %Dose : () mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (側管)		
⑧	5-FU 400mg/m ² 100%Dose : () mg %Dose : () mg () mg/body	5%糖液 100mL	全開で 投与	点滴 (メイン)		
⑨	5-FU 2400mg/m ² 100%Dose : () mg %Dose : () mg () mg/body	5%糖液 適量:合計115mL ※2.5mL/Hインフューザーポンプ	46時間	持続注		

※エルブラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(制吐剤前)にボラリン注投与
 +デカドロン5Aへ変更+エルブラット開始30分程度は減速投与で対応も可

