患者ID　<<PID>>　患者名　<<PATIENT_KANJI>>様　**4時間セット**

化療（NIVO＋mFOLFOX6 末梢用 胃）　（　　クール目　）

指　示　者

（ 身長　　cm　体重　　kg　体表面積　　m^2 ）

体表面積（Du Bois式） 71.84*身長^0.725*体重^0.425/10000

（　　）の理由にて、（　　）　%量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					／
①	生食　100mL		ルートキープ	点滴（メイン）	
②	**オプジーボ　240mg/body** （ **240** ）mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は60分	点滴 （メイン）	
③	○ ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ　150mg ◉ ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄなし	生食100mL	30分	点滴 （側管）	
④	パロノセトロン　0.75mg/50mL デカドロン3.3mg　1A		10分	点滴 （側管）	
⑤	**エルプラット※ 85mg/m^2** 100%Dose：　mg %Dose：　mg （　）mg/body **デカドロン3.3mg1A**	5%糖液 500mL	2時間	点滴 （メイン）	
⑥	**レボホリナート　200mg/m^2** 100%Dose：　mg （　）mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 （側管）	
⑦	**5－FU　400mg/m^2** 100%Dose：　mg %Dose：　mg （　）mg/body	5%糖液 100mL	全開で投与	点滴(ﾒｲﾝ)	
⑧	**5－FU　2400mg/m^2** 100%Dose：　mg %Dose：　mg （　）mg/body	生食 1L	46時間	持続注 （メイン）	

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前（制吐剤前）にポララミン注投与＋デカドロン5Aへ変更＋エルﾌﾟﾗｯﾄ開始30分程度は減速投与で対応も可

尿糖or血糖　自己測定指示　☑ あり　☐ なし

※インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を用いて投与する。

投与方法



投与スケジュール