

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様 6時間セット

化療 (mFOLFOX6+Biweekly C-mab CVポート用 大腸) (ケール目)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積 (Du Bois式) $71.84 * \text{身長} \sim 0.725 * \text{体重} \sim 0.425 / 10000$

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日 day1 /
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)	
②	ボラミン注5mg 1A デカドロン3.3mg (3)A ※症状に応じて変更可	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
③	アービタックス 500mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食500mL	2時間	点滴 (メイン)	
		※800mg以上の場合はNS250mL2Vで払出し			
経過観察(ルートキープをフラッシュ)			30分		30分
④	<input type="radio"/> ホスアプレビタント 150mg <input checked="" type="radio"/> ホスアプレビタントなし	生食100mL	30分	経過観察を 行いつつ 点滴 (側管)	
⑤	パロノセトロン 0.75mg/50mL		10分		
⑥	エルプラット* 85mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (メイン)	
⑦	レボホリナート 200mg/m ² 100%Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (側管)	
⑧	5-FU 400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 100mL	全開で 投与	点滴 (メイン)	
⑨	5-FU 2400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 適量:合計115mL	46時間	持続注	
		※2.5mL/Hインフューザーポンプ			

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(嘔吐前)にボラミン注投与+デカドロン5Aへ変更+エルプラット開始30分程度は減速投与で対応可

