

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療 (FP+NIVO 食道)

(クール目) ①~⑤⑩⑪は病棟で投与可

※前治療歴なし

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積 (Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

Day1: 4~7時間セット
 ↑ ①~⑤病棟施行の場合は4時間セット
 Day2~5: 2時間セット
 Day15: 1時間セット
 ...NIVO240mgの場合

() の理由にて、() %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日						
					day0	day1	day2	day3	day4	day5	day15
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)	/	/	/	/	/	/	/
②	硫酸マグネシウム 20mEq 1V KCL(カウム) 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管)							
③	ホスアプレピタント 150mg	生食250mL	30分	点滴 (側管)							
④	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管)							
④'	デカドロン 2A	生食500mL	1時間	点滴 (側管)							
⑤ ● 2W毎	オブジーボ 240mg/body (240)mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は1時間	点滴 (メイン)							
⑤' ○ 4W毎	オブジーボ 480mg/body (480)mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は1時間	点滴 (メイン)							
⑥	マンニトール300mL		40分	点滴 (側管)							
⑦	シスプラチン 40mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)							
⑧	シスプラチン 40mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)							
⑨	5FU 800mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body	生食 500mL	24時間	点滴 (メイン)							
⑩	EL-3号 500mL		2時間	点滴 (側管)							
⑪	EL-3号 500mL		2時間	点滴 (側管)							

尿糖or血糖 自己測定指示 あり なし

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し:体重測定で代用 Day()まで施行
 無し

CCDP投与量目安

CCr	投与量
CCr > 60	100%
60 ≥ CCr > 45	75%
45 ≥ CCr	投与中止が望ましい。

