

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

初回:6時間セット
2クール目~Day1:5時間セット
Day8:3時間セット

化療(CPT11+Weekly C-mab 大腸)

(      ) クール目 )

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること

( 身長      cm 体重      kg 体表面積      m<sup>2</sup> )


体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指 示 者
-------

(      ) の理由にて、(      ) %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬 物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					day1	day8
①	生食 100mL			ルートキープ(メインルート)		
②	ポララミン注5mg 1A デカドロン4mg ( 3 )A ※症状に応じて変更可	生食 100mL	30分	点滴 (側管)		
初回のみ ③	アビタックス 初回400mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      )mg/body	生食 500mL ※800mg以上の場合はNS250mL2Vで抽出し	2時間	点滴 (メイン)	初回のみ	
2回目以後 ③'	アビタックス 250mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      )mg/body	生食 250mL	1時間まで短縮可	点滴 (メイン)		
経過観察(ルートキープをフラッシュ)			30分or1時間		30分	1時間
④	○ ホスアプレピタト 150mg ● ホスアプレピタトなし	生食100mL	30分	点滴 (側管)		
⑤	パロノセトロン 0.75mg/50mL		10分	点滴 (側管)		
⑥	リノテカン(カンプト) 150mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      )mg/body	5%糖液 250mL	1.5時間	点滴 (メイン)		



投与スケジュール

