

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療(DCF療法 食道)

() クール目 ①~④⑨⑩は病棟で投与可

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

| 指示者 |
|-----|
| |

| |
|---|
| Day1:5or7時間セット ↑①~④病棟施行の場合は5時間セット |
| Day2~5:2時間セット |

() の理由にて、() %量で投与します。

| | 薬物 | 溶解液 | 投与時間 | 投与経路 | 投与日 | | | | |
|----|---|---------------------|------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |
| ① | 生食100mL | | | ルートキープ (メインルート) | / | / | / | / | / |
| ② | 硫酸マグネシウム 20mEq 1V KCL(カウム) 10mEq 1V | 生食 500mL | 1時間 | 点滴 (側管) | | | | | |
| ③ | ホスアプレピタント 150mg | 生食250mL | 30分 | 点滴 (側管) | | | | | |
| ④ | パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン 3A | | 10分 | 点滴 (側管) | | | | | |
| ④' | デカドロン 2A | 生食500mL | 1時間 | 点滴 (側管) | | | | | |
| ⑤ | ドセタキセル 70mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body | 5% ブドウ糖 250mL | 1時間 | 点滴 (メイン) | | | | | |
| ⑥ | マンニトール300mL | | 1時間 | 点滴 (側管) | | | | | |
| ⑦ | シスプラチン 35mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body | 生食 250mL | 1時間 | 点滴 (メイン) | | | | | |
| ⑧ | シスプラチン 35mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body | 生食 250mL | 1時間 | 点滴 (メイン) | | | | | |
| ⑨ | 5FU 750mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body | 生食 500mL | 24時間 | 点滴 (メイン) | | | | | |
| ⑩ | EL-3号 500mL×2本 | | 4時間 | 点滴 (側管) | | | | | |

| CCDP投与量目安 | |
|-----------|------------|
| CCr | 投与量 |
| CCr>60 | 100% |
| 60≧CCr>45 | 75% |
| 45≧CCr | 投与中止が望ましい。 |

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し:体重測定で代用 Day()まで施行
 無し

