

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様 6時間セット

**化療(FOLFIRI+Biweekly C-mab 大腸)** ( クール目 )

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること

( 身長          cm 体重          kg 体表面積          m<sup>2</sup> )


体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者

(          ) の理由にて、 (          ) %量で投与します。

※1ヶ月に1回M<sub>0</sub>測定する

|                    | 薬物   | 溶解液   | 投与時間  | 投与経路                        | 投与日<br>day1 / |
|--------------------|--|---|-------|-----------------------------|---------------|
| ①                  | 生食100mL  |   |       | ルートキープ(メインルート)              |               |
| ②                  | ポラミン注5mg 1A<br>デカドロン4mg ( 3 )A<br>※症状に応じて変更可   | 生食100mL   | 30分   | 点滴<br>(側管)                  |               |
| ③                  | <b>7-ピリタックス 500mg/m<sup>2</sup></b><br>100%Dose :      mg<br>%Dose :           mg<br>( <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">        </span> ) mg/body    | 生食500mL<br><br>※800mg以上の場合はNS250mL2Vで抽出し  | 2時間   | 点滴<br>(メイン)                 |               |
| 経過観察(ルートキープをフラッシュ) |  |   |       |                             | 30分           |
| ④                  | <input type="radio"/> ホスアプレピタト 150mg<br><input checked="" type="radio"/> ホスアプレピタトなし  | 生食100mL   | 30分   | 経過観察を<br>行いつつ<br>点滴<br>(側管) |               |
| ⑤                  | パロノセトロン 0.75mg/50mL  |   | 10分   |                             |               |
| ⑥                  | <b>レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup></b><br>100%Dose :      mg<br>( <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">        </span> ) mg/body                             | 5%糖液<br>250mL   | 2時間   | 点滴<br>(側管)                  |               |
| ⑦                  | <b>イリノテカン(カンブ) 150mg/m<sup>2</sup></b><br>100%Dose :      mg<br>%Dose :           mg<br>( <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">        </span> ) mg/body | 5%糖液<br>250mL   | 1.5時間 | 点滴<br>(メイン)                 |               |
| ⑧                  | <b>5-FU 400mg/m<sup>2</sup></b><br>100%Dose :      mg<br>%Dose :           mg<br>( <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">        </span> ) mg/body        | 5%糖液<br>100mL   | 全開で投与 | 点滴<br>(メイン)                 |               |
| ⑨                  | <b>5-FU 2400mg/m<sup>2</sup></b><br>100%Dose :      mg<br>%Dose :           mg<br>( <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">        </span> ) mg/body       | <input checked="" type="radio"/> CVポートあり<br>5%糖液 適量<br>:合計115mL<br>2.5mL/Hインフューザーポンプ<br>or<br><input type="radio"/> CVポートなし<br>生食 1L<br>点滴(輸液ポンプ) | 46時間  | 持続注<br>(メイン)                |               |



**投与スケジュール**

