

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

初回:7時間セット
2クール目~Day1:6時間セット
Day8:3時間セット

化療 (FOLFIRI+Weekly C-mab 大腸)

() クール目

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること


(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)
体表面積 (Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定する

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					day1	day8
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)	/	/
②	ボラミン注5mg 1A デカドロン4mg (3) A ※症状に応じて変更可	生食100mL	30分	点滴 (側管)		
初回のみ ③	アビタックス 400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食500mL	2時間	点滴 (メイン)	初回のみ	
2回目以後 ③	アビタックス 250mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食250mL	1時間まで短縮可	点滴 (メイン)		
経過観察 (ルートキープをフラッシュ)					30分	1時間
④	<input type="radio"/> ホスファレブタント 150mg <input checked="" type="radio"/> ホスファレブタントなし	生食100mL	30分	経過観察を 行いつつ 点滴 (側管)		
⑤	パロノセトロン 0.75mg/50mL		10分			
⑥	レボホリナート 200mg/m ² 100%Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (側管)		
⑦	イリリネン (キゾット) 150mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	1.5時間	点滴 (メイン)		
⑧	5-FU 400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 100mL	全開で投与	点滴 (メイン)		
⑨	5-FU 2400mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	<input checked="" type="radio"/> CVポートあり 5%糖液 適量 合計115mL 2.5mL/Hiインジェクターポンプ or <input type="radio"/> CVポートなし 生食 1L 点滴 (輸液ポンプ)	46時間	持続注 (メイン)		



投与スケジュール

