

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

4時間セット

化療(GCS 胆)

( クール目 )

( 身長 cm 体重 kg 体表面積 m<sup>2</sup> )


体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者


( ) の理由にて、( ) %量で投与します。

※生食100mLでルートキープ

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					day1
	生食250mL		45分	点滴 (側管1)	/
②	硫酸マグネシウム注20mL	生食 500mL	1.5時間	点滴 (側管1)	
③	生食250mL		45分	点滴 (側管1)	
④	○ ホスアプレタント 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管2)	
	● ホスアプレタントなし				
⑤	マンニトール300mL		45分	点滴 (側管2)	
⑥	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン4mg 2A		10分	点滴 (側管2)	
⑦	シスプラチン(アリプラチン) 25mg/m <sup>2</sup>	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	
	100%Dose : mg %Dose : mg ( )mg/body				
⑧	ゲムシタピン(ジェムサール)1000mg/m <sup>2</sup>	生食 100mL	30分	点滴 (メイン)	
	100%Dose : mg %Dose : mg ( )mg/body				
⑨	S-1 (投与量:下記参照)		1日2回 朝夕食後	内服	day1夕~day8朝 内服
	100%Dose : mg 段階減量 : mg ※減量は80mgまで ( )mg/body				
尿量測定指示 <input type="checkbox"/> 有り Day( )まで施行 <input type="checkbox"/> 無し:体重測定で代用 Day( )まで施行 <input type="checkbox"/> 無し					Day2,3 経口補水 (1,000mL)摂取



投与スケジュール



~S1投与量(腎機能に応じて減量)~

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg
1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg

CCr	投与量
CCr>80	基準量
80≧CCr>60	必要に応じて1段階減量
60≧CCr>40	1段階以上の減量
40≧CCr>30	2段階減量が望ましい。
30≧CCr	投与不可。

~シスプラチン減量基準~

CCr	CDDP投与量
>60	100%
60≧>45	75%
45≧	中止が望ましい

※ABC-02試験ではCr≦45は除外基準となっていた