

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

初回:3時間セット
初回以外のDay1:2時間セット
Day22:1時間セット

化療(NIVO+IPI 肺・中皮腫)

※1次治療のみ (PD-L1発現%に関わらず使用可、EGFR-、ALK-)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

(年)


Day1

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/
②	オプジーボ 360mg/body (<input type="text"/> 360)mg/body	生食 100mL	30分 以上 ※1クール目は60分	点滴 (メイン)	
30分以上経過観察					
③	ヤーボイ 1mg/kg 100%Dose : <input type="text"/> mg %Dose : <input type="text"/> % (<input type="text"/>)mg/body	生食 20mL	30分 以上 ※1クール目は60分	点滴 (メイン)	
※1~4mg/mLになるようにNS量適宜調整					

Day22

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/
②	オプジーボ 360mg/body (<input type="text"/> 360)mg/body	生食 100mL	30分 以上	点滴 (メイン)	

尿糖or血糖 自己測定指示 あり なし



投与スケジュール (年)

