患者ID　<<PID>>　患者名　<<PATIENT_KANJI>>様

初回：3時間セット
初回以外のDay1：2時間セット
Day22：1時間セット

化療（NIVO+IPI　肺・中皮腫）

（　　クール目　）

※1次治療のみ（PD-L1発現％に関わらず使用可、EGFR-、ALK－）

指　示　者

（　身長　　cm　体重　　kg　体表面積　　m^2　）

体表面積（Du Bois式）　71.84*身長^0.725*体重^0.425/10000

（　　）の理由にて、（　　）　%量で投与します。

（　　年）

Day1

	薬　物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					/
①	生食100mL		ルートキープ	点滴（メインルート）	
②	オプジーボ 360mg/body （　360　）mg/body	生食 100mL	30分以上 ※1クール目は60分	点滴（メイン）	
	30分以上経過観察				
③	ヤーボイ 1mg/kg 100%Dose：　mg %Dose：　mg （　　）mg/body ※1～4mg/mLになるようにNS量適宜調整	生食 20mL	30分以上 ※1クール目は60分	点滴（メイン）	

Day22

	薬　物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					/
①	生食100mL		ルートキープ	点滴（メインルート）	
②	オプジーボ 360mg/body （　360　）mg/body	生食 100mL	30分以上	点滴（メイン）	

尿糖or血糖　自己測定指示　☑ あり　☐ なし



投与スケジュール（　　年）