

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

1クール目:6時間セット
2クール目~:3時間セット

化療(PER+T-mab HER2陽性大腸)

() クール目 ()

※前治療歴のあるHER2陽性例

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000


指示者

※12週に1回心機能評価を行う

() の理由にて、() %量で投与します。

Day1					投与日
	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	day1 /
①	生食 100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	
②	<input checked="" type="checkbox"/> カロナール錠200mg 2T		開始時内服		
③	<input checked="" type="checkbox"/> ポラミン注5mg 1A	生食 100mL	30分	点滴(側管)	
④	パージェタ 840mg/body (840) mg/body	生食 250mL	60分	点滴 (メイン)	初回or前回投与日より6週以上経過後の投与時
投与後60分経過観察					
④'	パージェタ 420mg/body (420) mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	2回目以降 ※前回より6週以上経過後の投与時は初回量
投与後30分経過観察					
⑤	ハーセプチン 8mg/kg 100%Dose : () mg () mg/body	生食 250mL	90分	点滴 (メイン)	初回or前回投与日より4週以上経過後の投与時
投与後60分経過観察					
⑤'	ハーセプチン 6mg/kg 100%Dose : () mg () mg/body	生食 250mL	30分	点滴 (メイン)	2回目以降 ※前回より4週以上経過後の投与時は初回量
投与後30分経過観察					

投与方法



投与スケジュール

