

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

1・2クール目:4時間セット  
 3クール目～:3時間セット  
 (      ) クール目 )

化療(SIRB 大腸)

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること


( 身長      cm 体重      kg 体表面積      m<sup>2</sup> )  
 体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者  
 \_\_\_\_\_

(      ) の理由にて、(      ) %量で投与します。

Day1

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
①	生食 100mL		ルートキープ°	点滴 (メインルート)	/
②	○ ホスアプレピタント 150mg ● ホスアプレピタントなし	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
③	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン3.3mg 2A		10分	点滴 (側管)	
④	アバスチン 7.5mg/kg 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      ) mg/body	生食 100mL	1回目:90分 2回目:60分 3回目以降: 30分	点滴 (メイン)	
ルートキープをフラッシュ					
⑤	イリノテカン(カンプト) 150mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      ) mg/body	5%糖液 250mL	1.5時間	点滴 (メイン)	
⑥	S-1 (投与量:下記参照) 100%Dose :      mg 段階減量 :      mg ※減量は80mgまで (      ) mg/body		1日2回 朝夕食後	day1夕～ day15朝 内服	



S1投与量

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg
1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg

※S1は腎機能に応じて減量する

CCr	投与量
CCr>80	基準量
80≧CCr>60	必要に応じて1段階減量
60≧CCr>40	1段階以上の減量
40≧CCr>30	2段階減量が望ましい。
30≧CCr	投与不可。

投与スケジュール

