患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

4時間セット

化療（NIVO+mFOLFOX6 CVﾎﾟｰﾄ用 胃）

（ クール目 ）

指 示 者

（ 身長 cm 体重 kg 体表面積 m^2 ）

体表面積（Du Bois式） 71.84*身長^0.725*体重^0.425/10000

（ ）の理由にて、（ ） %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日 /
①	生食 100mL		ルートキープ	点滴（ﾒｲﾝ）	
②	**オプジーボ 240mg/body** (**240**) mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は60分	点滴 （ﾒｲﾝ）	
③	○ ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 150mg ◉ ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄなし	生食100mL	30分	点滴 （側管）	
④	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン3.3mg 2A		10分	点滴 （側管）	
⑤	**エルプラット※ 85mg/m^2** 100%Dose : mg %Dose : mg ( ) mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 （ﾒｲﾝ）	
⑥	**レボホリナート 200mg/m^2** 100%Dose : mg ( ) mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 （側管）	
⑦	**5－FU 400mg/m^2** 100%Dose : mg %Dose : mg ( ) mg/body	5%糖液 100mL	全開で投与	点滴 （ﾒｲﾝ）	
⑧	**5－FU 2400mg/m^2** 100%Dose : mg %Dose : mg ( ) mg/body	5%糖液 適量：合計115mL ※2.5mL/Hｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ	46時間	持続注 （ﾒｲﾝ）	

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前（制吐剤前）にポララミン注投与＋デカトロン5Aへ変更＋ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ開始30分程度は減速投与で対応も可

尿糖or血糖 自己測定指示 ☑ あり ☐ なし

※インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を用いて投与する。

投与方法



投与スケジュール



鹿児島厚生連病院