

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

1クール目～:6時間セット
2クール目～:5時間セット

化療(FOLFOXIRI+BV 未梢用 大腸) () クール目

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること
(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)
体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
①	生食 100mL		ルートキープ(メインルート)		
②	ホスアプレピタント150mg	生食100mL	30分	点滴(側管)	
③	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン3.3mg 2A		10分	点滴(側管)	
④	アバステン 5mg/kg 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食 100mL	1回目:90分 2回目:60分 3回目以降:30分	点滴(メイン)	
ルートキープをフラッシュ					
⑤	イリノテカン(カンプト) 165mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	1時間	点滴(メイン)	
⑥	レボホリナート 200mg/m ² 100%Dose : mg () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴(側管)	
⑦	エルプラット 85mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body デカドロン3.3mg1A	5%糖液 500mL	2時間	点滴(メイン)	
⑧	5-FU 3200mg/m ² 100%Dose : mg %Dose : mg () mg/body	生食 1L	48時間	持続注	

デカドロン錠 (8) mg (day2~3日間)

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(制吐剤前)にポララミン注投与+デカドロン5Aへ変更+エルプラット開始30分程度は減速投与で対応も可

