

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

3時間セット

化療(ビラフトビ+メクトビ+Biweekly Cmam 大腸)

( <> クール目 )

※前治療歴があるBRAF変異陽性患者に使用

( 身長 <> cm 体重 <> kg 体表面積 <> m<sup>2</sup> )


体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者

( <> ) の理由にて、( <> ) %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg・CPK測定を行う、12週毎に心機能評価を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日 day1
①	生食 100mL		ルートキープ(メインルート)		/
②	ポラミン注5mg 1A デカドロン4mg ( 3 )A ※症状に応じて変更可	生食 100mL	30分	点滴 (側管)	
③	アービタックス 500mg/m <sup>2</sup> 100%Dose : <> mg %Dose : <> mg ( <> )mg/body	生食 500mL ※800mg以上の場合はNS250mL2Vで払出し	2時間	点滴 (メイン)	
④	ビラフトビカプセル 通常300mg/body(規格:75mg) ( <> 300 )mg/body		1日1回 夕食後	内服	
⑤	メクトビ錠 通常90mg/body(規格:15mg) ( <> 90 )mg/body		1日2回 朝夕食後 (1クール目 Day1夕~開始)	内服	



投与スケジュール

