

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

1クール目～:6時間セット  
2クール目～:5時間セット

化療(FOLFOXIRI+BV CVポート用 大腸) (      クール目 )

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること

( 身長      cm 体重      kg 体表面積      m<sup>2</sup> )  
体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者


(      ) の理由にて、 (      ) %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
①	生食 100mL		ルートキープ(メインルート)		
②	ホスアプレピタント150mg	生食100mL	30分	点滴(側管)	
③	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン3.3mg 3A		10分	点滴(側管)	
④	アバステン 5mg/kg 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      ) mg/body	生食 100mL	1回目:90分 2回目:60分 3回目以降:30分	点滴(メイン)	
ルートキープをフラッシュ					
⑤	イリノテカン(カンプト) 165mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      ) mg/body	5%糖液 250mL	1時間	点滴(メイン)	
⑥	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg (      ) mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴(側管)	
⑦	エルプラット 85mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      ) mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴(メイン)	
⑧	5-FU 3200mg/m <sup>2</sup> 100%Dose :      mg %Dose :      mg (      ) mg/body	5%糖液 適量 合計240mL 5mL/Hインフューザーポンプ	48時間	持続注	

デカドロン錠 (8) mg (day2～ 3 日間)

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(制吐剤前)にボラミン注投与+デカドロン5Aへ変更+エルプラット開始30分程度は減速投与で対応も可

投与方法



投与スケジュール

