

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療(bDCF療法 食道)

() クール目 ①~④⑨⑩は病棟で投与可

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)
 体表面積 (Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

Day1:5or7時間セット ↑①~④病棟施行の場合は5時間セット
Day2~5:2時間セット
Day15:2時間セット

() の理由にて、() %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日					
					day1	day2	day3	day4	day5	day15
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)	/	/	/	/	/	/
②	硫酸マグネシウム 20mEq 1V KCL(カウム) 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
③	ホスアプレピタント 150mg	生食250mL	30分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④'	デカドロン 2A	生食500mL	1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④''	グラニセトロン3mg/100mL デカドロン 2A		30分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑤	ドセタキセル 30~40mg/m ² 100%Dose: ~ mg %Dose: ~ mg ()mg/body	5% ブドウ糖 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑥	マンニトール300mL		1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑦	シスプラチン 40mg/m ² 100%Dose: mg %Dose: mg ()mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑧	シスプラチン 40mg/m ² 100%Dose: mg %Dose: mg ()mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑨	5FU 800mg/m ² 100%Dose: mg %Dose: mg ()mg/body	生食 500mL	24時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑩	EL-3号 500mL×2本		4時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≥CCr>45	75%
45≥CCr	投与中止が望ましい。

尿量測定指示 有り Day()まで施行
 無し:体重測定で代用 Day()まで施行
 無し

