

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様

1・2クール目:4時間セット  
3クール目～:3時間セット

化療(XELIRI+BV 大腸)

(  クール目 )

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること

( 身長  cm 体重  kg 体表面積  m<sup>2</sup> )  
体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者

(  ) の理由にて、(  ) %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
	生食 100mL		ルートキープ (メインルート)		/
②	○ ホスアプレタト 150mg ● ホスアプレタトなし	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
③	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン3.3mg 2A		10分	点滴 (側管)	
④	アバスチン 7.5mg/kg 100%Dose : <input type="text"/> mg %Dose : <input type="text"/> mg ( <input type="text"/> ) mg/body	生食 100mL	1回目:90分 2回目:60分 3回目以降:30分	点滴 (メイン)	
ルートキープをフラッシュ					
⑤	イリノテカン 200mg/m <sup>2</sup> 100%Dose : <input type="text"/> mg %Dose : <input type="text"/> mg ( <input type="text"/> ) mg/body	5%糖液 250mL	1.5時間	点滴 (メイン)	
⑥	ゼローダ 100%Dose : <input type="text"/> mg 段階減量 : <input type="text"/> mg ( <input type="text"/> ) mg/body		1日2回/2週間 (day1夕より服用)	内服	

投与方法		ゼローダ投与量	
Day1~2	①ルートキープ:ケモセフロック輸液セット ※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ ② 30分 → ③ 10分 → ④ 1回目90分 2回目60分 3回目以降30分 → ⑤ 1.5時間	体表面積	1日投与量
		1.31m <sup>2</sup> 未満	1800mg/day
		1.31m <sup>2</sup> 以上1.64m <sup>2</sup> 未満	2400mg/day
		1.64m <sup>2</sup> 以上	3000mg/day
		※CCr30-50mL/min以下では1段階減量 CCr30mL/min未満では投与中止	

投与スケジュール

