

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJI>>様 4時間セット

**化療(NIVO+XELOX 胃)** (      クール目 )

( 身長      cm 体重      kg 体表面積      m<sup>2</sup> )  
 体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者

(      ) の理由にて、(      ) %量で投与します。

					投与日
No.	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	/
①	生食 100mL		ルートキープ(メインルート)		
②	オブジーボ 360mg/body ( <span style="background-color: yellow;">    </span> ) mg/body	生食 100mL	30分以上 ※初回は60分	点滴 (メイン)	
③	◎ ホスアプレピタント 150mg ○ ホスアプレピタントなし	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
④	パロノセトロン 0.75mg/50mL デカドロン4mg 1A		10分	点滴 (側管)	
⑤	エルプラット※ 130mg/m <sup>2</sup> 100%Dose:           mg %Dose:               mg ( <span style="background-color: yellow;">    </span> ) mg/body ----- デカドロン4mg 1A	5%糖液  500mL	2時間	点滴 (メイン)	
⑥	ゼローダ 100%Dose:           mg 段階減量:           mg ( <span style="background-color: yellow;">    </span> ) mg/body	1日2回/2週間 (day1夕より服用)			
尿糖or血糖 自己測定指示 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし					

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(制吐剤前)にポラミン注投与+デカトロン5Aへ変更+エルプラット開始30分程度は減速投与で対応も可

※インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて投与する。

**投与方法**

Day1

※メインで抗がん剤投与中にはルートキープはクランプ

①フィルター付きケモセーブロック輸液セット

② | ③ | ④ | ⑤

30分 | 30分 | 10分 | 2時間

※②初回:60分

**ゼローダ投与量**

体表面積	1日投与量
1.36m <sup>2</sup> 未満	2400mg/day
1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満	3000mg/day
1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	3600mg/day
1.96m <sup>2</sup> 以上	4200mg/day

※CCr30-50mL/min以下では1段階減量  
CCr30mL/min未満では投与中止

**投与スケジュール**

