

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様 6時間セット

化療(sLV5FU2+Biweekly C-mab 大腸) (クール目)


(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)
 体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
					day1 /
①	生食 100mL			ルートキープ(メインルート)	
②	ボラミン注5mg 1A デカドロン4mg (3)A ※症状に応じて変更可	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
③	ア-ピタックス 500mg/m² 100%Dose : mg %Dose : mg (<input type="text"/>) mg/body	生食500mL ※800mg以上の場合はNS250mL2Vで払出し	2時間	点滴 (メイン)	
経過観察(ルートキープをフラッシュ)			30分or1時間		30分
④	グラニセトロン3mg/100mL		30分	経過観察を 行いつつ 点滴 (側管)	
⑤	レボホリナート 200mg/m² 100%Dose : mg (<input type="text"/>) mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴 (側管)	
⑥	5-FU 400mg/m² 100%Dose : mg %Dose : mg (<input type="text"/>) mg/body	5%糖液 100mL	全開で投与	点滴 (メイン)	
⑦	5-FU 2400mg/m² 100%Dose : mg %Dose : mg (<input type="text"/>) mg/body	● CVポートあり 5%糖液 適量 :合計115mL 2.5mL/Hインフューザーポンプ or ○ CVポートなし 生食 1L 点滴(輸液ポンプ)	46時間	持続注	



投与スケジュール

