

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

初回:6時間セット
2クール目~Day1:5時間セット
Day8:3時間セット

治療(sLV5FU2+Weekly C-mab 大腸)

() クール目

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)


体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日	
					day1 /	day8 /
①	生食 100mL		ルートキープ(メインルート)			
②	ボラミン注5mg 1A デカドロン4mg (3)A ※症状に応じて変更可	生食100mL	30分	点滴(側管)		
初回のみ ③	アビタックス 400mg/m ² 100%Dose: () mg %Dose: () mg/body	生食500mL	2時間	点滴(メイン)	初回のみ	
2回目以後 ③'	アビタックス 250mg/m ² 100%Dose: () mg %Dose: () mg/body	生食250mL	1時間まで短縮可	点滴(メイン)		
経過観察 (ルートキープをフラッシュ)			30分or1時間		30分	1時間
④	グラニセトロン3mg/100mL		30分	経過観察を行いつつ点滴(側管)		
⑤	レボホリナート 200mg/m ² 100%Dose: () mg %Dose: () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴(側管)		
⑥	5-FU 400mg/m ² 100%Dose: () mg %Dose: () mg/body	5%糖液 100mL	全開で投与	点滴(メイン)		
⑦	5-FU 2400mg/m ² 100%Dose: () mg %Dose: () mg/body	<ul style="list-style-type: none"> ● CVポートあり 5%糖液 適量 :合計115mL 2.5mL/H インフューザーポンプ or ○ CVポートなし 生食 1L 点滴(輸液ポンプ) 	46時間	持続注		



投与スケジュール

